

## Tipps:

- ▶ Beim Husten und Niesen die Wirbelsäule aufrichten, den Kopf zur Seite drehen und den Beckenboden nach innen ziehen. So bringen Sie weniger Druck auf den Beckenboden und können den Harn besser halten.
- ▶ Beim Stillen/Fläschen geben immer versuchen möglichst angenehm zu sitzen und den Rücken anzulehnen, um weiteren Verspannungen der Schulter-, Nacken- und Rückenmuskulatur vorzubeugen.
- ▶ Setzen Sie sich aus dem Liegen immer über die Seitenlage auf. Auch beim Hinlegen kommen Sie wieder über die Seitenlage in die Rückenlage.
- ▶ In den ersten 3 Wochen nur das Gewicht des Babys tragen – möglichst körpernahe, um den Beckenboden zu schonen.
- ▶ Der Beckenboden ist durch die Schwangerschaft und die Geburt geschwächt. Vermeiden Sie daher für mindestens sechs Monate starke Belastungen wie Laufen, Springen und schweres Heben.

Für Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen der Physiotherapie gerne zur Verfügung!

## Rückbildungsgruppe

Um die Übungen im Spätwochenbett kontinuierlich zu steigern, empfehlen wir die Teilnahme an unserer Rückbildungsgruppe.  
Empfohlener Beginn ist **vier Wochen** nach der Geburt.

**Kurszeiten:** Montag, Dienstag, Mittwoch 11.30 – 12.30 Uhr  
(Änderungen vorbehalten. Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Website.)  
**Kursort:** Bewegungsraum im Kurszentrum (Ebene 4, Lift A)  
**Kursleitung:** Die Physiotherapeutinnen des Hauses

Der Kurs findet ganzjährig statt, ein Einstieg ist jederzeit möglich. Babys sind herzlich willkommen, solange sie noch nicht mobil sind (krabbeln, rollen) und auf ihrer Matte bleiben.

**Termine, Preise und Anmeldung**  
[www.sjk-wien.at/gz](http://www.sjk-wien.at/gz) oder 1 87844-9510  
Die Kurskarten sind im Kurszentrum erhältlich.

### St. Josef Krankenhaus GmbH

Auhofstraße 189 · 1130 Wien

T: +43 1 87844-0

[office@sjk-wien.at](mailto:office@sjk-wien.at) · [www.sjk-wien.at](http://www.sjk-wien.at)

Druck: [druck.at](http://druck.at), 2544 Leobersdorf · Stand: November 2025

Ein Unternehmen der  
Vinzenz Kliniken Wien



## Rückbildung nach der Geburt

Vaginale Entbindung



Hier geht's zu den  
Übungsvideos!

Gesundheit  
kommt von Herzen.

 **St. Josef**  
Krankenhaus Wien

## Rückbildung nach der Geburt

Durch die schwangerschaftsbedingte Beanspruchung der Bauch- und Beckenbodenmuskulatur sind die beiden Muskelgruppen aus dem Gleichgewicht geraten und benötigen spezielles Training. Daher ist es wichtig, schon im Frühwochenbett (bis zum 14. Tag nach der Geburt) mit der Rückbildungsgymnastik zu beginnen.


**Folgende Übungen können ab dem 1. Tag nach der Geburt mehrmals täglich durchgeführt werden:**

### 1. Muskelpumpe

**Ziel:** Thromboseprophylaxe, Kreislaufaktivierung und Entstauung

**Durchführung:**

- ▶ Sprunggelenk kräftig beugen und strecken
- ▶ Finger kräftig öffnen und schließen



### 2. Aktivierung der Grundspannung

**Ziel:** Bauchatmung und Wahrnehmung des Beckenbodens

**Durchführung:**

- ▶ Tief durch die Nase einatmen (die Bauchdecke hebt sich), fest durch den Mund auf „pf“ ausatmen (die Bauchdecke senkt sich)
- ▶ Grundspannung während der Ausatmung aktivieren:
  - Unterbauch kurz: Schambein Richtung Nabel ziehen – nur durch Muskelaktivierung (ohne das Becken zu kippen)
  - Oberbauch schmal: Rippenbögen zusammenziehen



**Die Übung ist in unterschiedlichen Ausgangsstellungen möglich:**

- ▶ Rückenlage mit aufgestellten Beinen; Hände auf den Unterbauch legen – 10 Wiederholungen 3x täglich
- ▶ Seitenlage mit abgelegtem Kopf; Hand auf den Unterbauch legen, sobald schmerzfrei möglich – 10 Wiederholungen pro Seite 3x täglich



**Sobald wie möglich kann auch folgende Ausgangsstellung eingenommen werden:**

- ▶ Bauchlage mit Polster unter dem Bauch – unterstützt gleichzeitig die Rückbildung der Gebärmutter und entlastet den Beckenboden. 2x täglich mindestens 10 Minuten einnehmen.



**Hinweis:** Durch die Bauchlage kann es zu verstärktem Wochenfluss und Nachwehen kommen.

**Frühestens vier Wochen nach der Geburt kann das Übungsprogramm durch Training der Beckenboden- und Rumpfmuskulatur ergänzt werden.**

### 3. Beckenboden

Der Beckenboden besteht aus Muskelschichten, die sich zwischen Schambein, Sitzbeinhöckern und Steißbein spannen. Die Hauptaufgaben sind die Haltefunktion, das Entspannen und Loslassen (z. B. Urinieren) und das reflektorische Anspannen (automatisches Harnhalten bei vermehrter Druckbelastung, z. B. Husten).

Durch die geburtsbedingte Dehnung des Beckenbodens ist die Wahrnehmung dieser Muskulatur beeinträchtigt und gegebenenfalls verletzt. Um die Wundheilung nicht zu stören, steht in den ersten drei Wochen nach der Geburt die Schonung des belasteten Beckenbodens im Vordergrund.

Danach kann mit dem Beckenbodentraining begonnen werden, um Harninkontinenz und Senkungsbeschwerden vorzubeugen. Der Beckenboden wird angespannt indem die Scheide nach innen gezogen wird, wie z. B. beim Zurückhalten des Harns.

**Folgende Übungen sind in jeder Ausgangsstellung möglich:**

#### 3.a. Blinzeln

After, Scheide und Harnröhre kurz mehrere Male hintereinander anspannen. Vorstellungshilfe: Blinzeln der Augen.

#### 3.b. Blüte

Den Beckenboden sanft anspannen und entspannen. Vorstellungshilfe: eine Blüte, die sich öffnet und schließt.

#### 3.c. Seilbahn

„Die Seilbahn“ dient zur Wiedererlangung der vollen Haltefunktion des Beckenbodens. Stellen Sie sich folgendes vor: Zwischen Steißbein und Schambein befindet

sich ein Seil. An diesem Seil hängt eine Gondel. Diese wird nun langsam, entlang des Seiles, vom Steißbein zum Schambein gezogen, und dann wieder abgesenkt.

#### 3.d. Übung „fittt“

Die Übung 3.a. (Blinzeln) wird durch den Einsatz von Sprechlauten gesteigert: Jedes kurze Anspannen des Beckenbodens wird durch das kräftig ausgesprochene Wort „fittt“ (das „t“ muss gut hörbar sein) begleitet.

## 4. Rumpfmuskulatur

#### 4.a. Schräge Sit Ups

**Ziel:** Schließen der Rectusdiastase<sup>1</sup> und Kräftigung der Bauchmuskulatur

**Durchführung:** Rückenlage mit aufgestellten Beinen.

Fingerspitzen hinter die Ohren legen, Ellbögen zeigen nach außen. Während der Ausatmung die Grundspannung (siehe Übung 2) aktivieren, dabei Ellbogen und Knie diagonal zusammenführen. Seitenwechsel nicht vergessen!



#### 4.b. Vierfüßlerstand

**Ziel:** Kräftigung der Rumpfmuskulatur

**Durchführung:** Vierfüßlerstand am Boden. Während der Ausatmung Grundspannung aktivieren, dabei Handfläche und Knie diagonal ca. 2 cm vom Boden lösen.



#### 4.c. Seitstütz

**Ziel:** Kräftigung der Rumpf- und Stützmuskulatur

**Durchführung:** Stütz am Unterarm mit abgewinkelten Beinen. Während der Ausatmung die Grundspannung aktivieren; dabei Becken von der Unterlage abheben.

**Steigerung:** Nicht nur das Becken sondern auch das obere Bein abheben. Seitenwechsel nicht vergessen!

**Hinweis:** Wichtig ist, den Rücken gerade zu halten und nicht ins Hohlkreuz zu kippen.



<sup>1</sup> Durch ein Training der schrägen Bauchmuskulatur wird die Rectusdiastase – das schwangerschaftsbedingte Auseinanderweichen der geraden Bauchmuskeln – geschlossen.